

HPV AŞISI

HPV aşısı hem kadınlara hem erkeklere uygulanır.

HPV Aşı Takvimi

Yaş Aralığı	Doz Sayısı	Uygulama Şeması
9-15 yaş	2 doz	1. doz → 6 ay sonra 2. doz
15-45 yaş	3 doz	1. doz → 2 ay sonra 2. doz → 1. dozdan 6 ay sonra 3. doz



TARAMA İÇİN

- KETEM (KANSER ERKEN TEŞHİS TARAMA VE EĞİTİM MERKEZİ)
- TSM (TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ)
- ASM (AİLE HEKİMLİĞİ) ne başvurabilirsiniz.

Hazırlayan : Onkoloji Hemşiresi Aysun AKBEY
Onkoloji Eğitim Hemşiresi Ayşegül ÇİMENTEPE



PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ
TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI

RAHİM AĞZI KANSERİ (SERVİKS KANSERİ)



Kansersiz Yaşam, Sizin Elinizde!
Kanserden Korunmak İçin Şimdi Sıra Sizde!

KH. YD.13 (TO) / 04.03.2026/-/ REV. 0

SERVİKS KANSERİ: Rahim ağzındaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu gelişir.

RİSK FAKTÖRLERİ

- HPV (Human Papillomavirus) enfeksiyonu (en önemli neden)
- Erken yaşta cinsel ilişki
- Birden fazla cinsel partner
- Sigara kullanımı
- Bağışıklık sisteminin zayıf olması
- Çok sayıda doğum
- Uzun süreli doğum kontrol hapı kullanımı
- Obezite

BELİRTİLER

Erken dönemde genellikle belirti vermez.

İleri dönem belirtiler:

- Farklı renk ve kokuda vajinal akıntı
- Cinsel ilişki sırasında ağrı ve sonrası kanama
- Adet süresinde ve kanama miktarında artış
- Kasık, bel ve pelvik bölgede ağrı
- Bacaklarda ağrı ve şişlik
- İdrar yaparken zorlanma
- Nedensiz kilo kaybı ve halsizlik



Tarama testleri, hastalık oluşmadan önce riskli hücreleri tespit eder.

TARAMA TESTLERİ

21-29 yaş:

3 yılda bir
Pap smear testi

65 yaş sonrası:

Son 10 yıl içinde yapılan testler normal ise tarama sonlandırılabilir.

Aktif cinsel yaşam olmasa da tarama testleri yapılmalıdır!

30-65 yaş:

HPV DNA Testi,

Pap Smear

HPV DNA Testi

5 yılda bir HPV DNA testi + Pap smear

veya

3 yılda bir yalnız Pap smear



TEST ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Adet (regl) döneminde olmamak, Testten 48 saat önce cinsel ilişki olmaması, Vajinal duş yapılmaması (2 gün), Vajina içine ilaç/krem uygulanmaması (2gün)