






Aşı Uygulama Teknikleri

Aşı adı	BCG	DABT-IPa-Hib/DT/Td/Hep B/Hib/KPA	KKK/Kızamık/Kızamıkçık	OPA
Uygulama yeri	Sol omuz bölgesi	12 aya kadar uyluğun orta dış kısmı, daha büyüklerde üst kolun dış kısmında deltoid kas	Üst kolun dış kısmında deltoid kasa uyan bölge	Oral
Uygulanma şekli	Cilt içine enjeksiyon	Intramusküler enjeksiyon	Subkutan enjeksiyon	Oral damlalık
Doz	0 yaşta 0,05 ml, 1 yaş üzerinde 0.1 ml	0.5 ml Hep B 10 yaş ve üzerinde 1 ml	0.5 ml	2 damla
Tipi	Toz + Sulandırıcı	Kullanıma hazır/Toz+Sulandırıcı	Toz + Sulandırıcı	Oral damlalıklı flakon
Görünüm	Beyaz, içinde sallanma kaybolan gökeltinin bulunduğu bulanık sıvı	Beyaz, içinde sallanma kaybolan gökeltinin bulunduğu bulanık sıvı	Berrak, hafif sarı sıvı	Berrak, pembe ya da turuncu sıvı
				



Bebeklere IM enfeksiyon uygulaması şeması



İğnenin farklı pozisyonları